

Тигровая акула

Автор: Administrator
23.11.2016 00:00 -



Тигровая (леопардовая) акула является одним представителем хрящевых рыб семейства серых акул в отряде кархаринообразных. Это одни из наиболее популярных видов акул в мире.

Тигровые акулы очень популярны в субтропическом и тропическом поясах Мирового океана. Они обитают в открытой воде и около берегов. В особенности распространены около островов в центре Тихого океана. Ведут преимущественно ночной образ жизни. В длину достигают 5,5 метров.

Размножаются акулы живорождением, в помете имеют до 80 новорожденных рыбок. Опасны для человека, но являются объектом промысла.

Ареал обитания

Встречаются тигровые акулы неподалеку от берегов, по большей части в

Тигровая акула

Автор: Administrator
23.11.2016 00:00 -

субтропических и тропических водах. Они по большей части ведут кочевой образ жизни. В холода держатся близко к экватору, а «переезды» связаны с теплыми течениями.

Данный тип любит оставаться на глубинах, неподалеку от рифов, но при преследовании добычи способен выбираться на мель. На западе Тихого океана такие акулы попадают от Японии до Новой Зеландии.

Часто эта разновидность встречается в Мексиканском заливе, около берегов Южной и Северной Америки. Он широко популярен в Красном и Карибском море.

Зафиксированы леопардовые акулы на глубине примерно 900 метров. Некоторые из источников гласят, что они способны подойти к берегу на такую глубину, что чаще всего считается чересчур мелкой для таких акул, они даже бывают в эстуариях рек.

На Гавайских островах тигровые акулы систематически замечаются на глубине 6-12 метров.

Описание вида

Передняя часть туловища утолщена, к брюху заметно сужается. Крупная голова с крупными глазами и укороченным тупым рылом отличается клиновидной формой, она легко поворачивается из одной стороны в другую. Вдоль верхней губы расположена удлинённая борозда. Расстояние от кончика рыла до рта равняется расстоянию между ноздрями, оно гораздо меньше длины рта.

За глазами располагаются щелевидные крупные брызгальца. Ноздри мелкие, между ними расстояние в 3 раза больше, чем их ширина. Впереди их обрамляет широкая складка кожи в форме треугольника. Рыло тигровых акул покрывается расширенными порами. Это электрорецепторы, которые дают возможность уловить изменения электрического поля. При помощи боковой линии, что тянется вдоль туловища по бокам, акулы способны засечь самые минимальные вибрации в водной среде. Такие приспособления дают возможность найти добычу в темноте.

Первый плавник на спине широкий и высокий. Основание его начинается сзади грудных плавников. Оно разместилось ближе к грудным плавникам, чем к брюшным. Другой плавник на спине небольшой, его высота достигает $\frac{2}{5}$ или меньше от высоты спинного.

Рот леопардовой акулы очень большой, челюстные мышцы очень мощные. Каждый зуб обладает скошенной вершиной и лезвием с зазубринами. Край каждой из зазубрин покрыт еще более мелкими зазубринами. Нижние и верхние зубы похожи по размеру и форме. Зубы приспособляются для того, дабы рассечь плоть.